

Alcohol Use Scale (AUS)

Drake, R.E., Mueser, K.T. & McHugo, G.J.
(Version française: Division
psychosociale, Centre de Recherche de
l'hôpital Douglas)

Numéro de dossier:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date de l'évaluation

		/			/				
mois			jour			année			

Intervenant:

--

Veillez évaluer la consommation d'alcool de votre client au cours des 6 DERNIERS MOIS selon l'échelle suivante. Si la personne est institutionnalisée, évaluez-la pour la période antérieure à son admission. Veillez tenir compte des informations obtenues de l'autodéclaration du client, d'entrevues, d'observations du comportement et des informations provenant de tiers (famille, centre de jour, milieu de vie, etc.) pour faire votre évaluation. NOIRCIR LE CERCLE APPROPRIÉ. EN CHOISIR SEULEMENT UN.

- 1 ☐ **ABSTINENT** Le client n'a pas consommé d'alcool au cours de cette période

-
- 2 ☐ **CONSOMMATION SANS EFFETS NUISIBLES** Le client a consommé de l'alcool au cours de cette période, mais il n'y a pas de signes de problèmes persistants et récurrents d'ordre social, professionnel, psychologique ou physique liés à la consommation, ni de signes de consommation récurrente dangereuse.

-
- 3 ☐ **ABUS**. Le client a consommé de l'alcool au cours de cette période et il y a des signes de problèmes persistants et récurrents d'ordre social, professionnel, psychologique ou physique liés à la consommation ou il y a des signes de consommation récurrente dangereuse. Par exemple, la consommation récurrente de drogues entraîne un comportement perturbateur et des problèmes de logement. Les problèmes ont persisté pendant au moins un mois.

-
- 4 ☐ **DÉPENDANCE** Satisfait aux critères de la dépendance modérée et présence d'au moins trois des éléments suivants: quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long que prévu, beaucoup de temps employés à se procurer ou à consommer de l'alcool, intoxication fréquente ou sevrage interfère avec d'autres activités, abandon d'activités importantes à cause de la consommation d'alcool, poursuite de la consommation en dépit de la connaissance des problèmes reliés à l'alcool, tolérance marquée, symptômes de sevrage caractéristiques, consommation d'alcool pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage. Par exemple, l'usager a laissé tomber des cours de formation professionnelle et des activités sociales sans alcool à cause de ses cuites et de sa préoccupation par rapport à l'alcool.

-
- 5 ☐ **DÉPENDANCE AVEC INSTITUTIONNALISATION** Satisfait aux critères de la dépendance sévère. Deplus, les problèmes connexes sont si graves qu'ils rendent la vie non-institutionnelle difficile. Par exemple, la consommation constante d'alcool entraîne un comportement perturbateur et l'incapacité de payer son loyer, ce qui fait que le client est souvent signalé à la police et en quête d'hospitalisation.

Temps de dépistage:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 0 mois | ☐ 15 mois |
| ☐ 3 mois | ☐ 18 mois |
| ☐ 6 mois | ☐ 21 mois |
| ☐ 9 mois | ☐ 24 mois |
| ☐ 12 mois | |